

GUÍA DE COLOR

Tarjetón Encefalitis Equina 10 frascos x 10 ds.
Impresión Litogr. a 3 tintas: Rojo: pantone 485C
Negro 100% - Dorado: pantone 873C
Tamaño: 12 cm largo x 12 cm alto
Gramaje 320 g/m2 **Tiro plastificado**
Versión 00
(2023-04-18)

Vacuna ENCEFALITIS EQUINA

10 Frascos x 10 Dosis
con su respectivo
diluyente

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**
Consérvese refrigerado entre 2°C y 8°C

USO VETERINARIO

VACUNA LIOFILIZADA

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida
de 2 ml contiene:
Virus vivo atenuado de la
Encefalomiелitis Equina
Venezolana Cepa
TC 83: 10^{5.0} DICT 50%.
(DICT= Dosis infectante
en cultivo de tejido).

Elaborado y Distribuido por
VECOL S. A. Bogotá D.C.- Colombia
Col. Rég. ICA No. 998-DB
Ven. SASA B.I.5.979



INDICACIONES

Para la inmunización activa de los equinos, asnales y mulares sanos contra la enfermedad de la Encefalomiелitis Equina Venezolana (EEV).

- Vacunar a todos los animales jóvenes desde los 3 meses de edad.
- Equinos menores de 2 semanas de edad y hembras preñadas no deben ser vacunados.
- Revacunar cada 2 años o antes si las autoridades sanitarias así lo recomiendan.

GENERALIDADES

La EEV, es una enfermedad infecciosa de naturaleza viral, que se caracteriza por: fiebre, perturbaciones sensoriales, incoordinación de los movimientos, periodos de excitación, depresión, letargo y elevada mortalidad.

Por ser una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a hombres, la vacunación preventiva de los animales es la única arma de defensa contra la enfermedad.

La inmunización con la vacuna Encefalitis Equina de Vecol se evidencia mediante la aparición de anticuerpos al 90. día después de la aplicación.

De 3 a 5 días después de esta puede presentarse ligera reacción febril.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vacuna reconstituida se administra por **vía subcutánea**, en la región retroescapular (atrás de la paleta) o en la tabla del cuello, en dosis de **2 ml** por animal.

Reconstituir cada frasco de 10 dosis con 20 ml de diluyente (Agua estéril para inyección).

PRECAUCIONES

- Después de reconstituido el producto úselo inmediatamente, manteniendo en refrigeración 2°C a 8°C y al abrigo de la luz directa del sol.
- Los envases vacíos y los sobrantes deben disponerse de acuerdo a las normas ambientales vigentes del país.
- Utilice una aguja estéril por cada animal a vacunar.
- Evite el uso de desinfectantes en las agujas y en el sitio de aplicación.
- Las personas autorizadas para la aplicación del biológico o colaboradores, deben evitar tener la inoculación accidental con el biológico o el contacto directo de este con membranas mucosas y ojos. En caso de accidente informe a los servicios de salud o consulte al Médico.
- Como sucede en otras vacunaciones, en animales susceptibles pueden presentarse reacciones anafilácticas después de su uso; se recomienda una terapia de soporte apropiada.



Vecol S.A. Bogotá D.C.- Colombia

V00



4 mm

GUÍA DE COLOR

Tarjetón Encefalitis Equina 10 frascos x 5 ds.
Impresión Litogr. a 3 tintas: Rojo: pantone 485C
Negro 100% - Dorado: pantone 873C
Tamaño: 12 cm largo x 8 cm alto
Gramaje 320 g/m2 **Tiro plastificado**
Versión 00
(2023-04-18)

Vacuna ENCEFALITIS EQUINA

10 Frascos x 5 Dosis
con su respectivo
diluyente



USO VETERINARIO

VACUNA LIOFILIZADA

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida de 2 ml contiene:
Virus vivo atenuado de la
Encefalomielititis Equina Venezolana
Cepa TC 83: 10^{5.0} DICT 50%.
(DICT= Dosis infectante en cultivo de tejido).

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Consérvese refrigerado entre 2°C y 8°C

Elaborado y Distribuido por
VECOL S. A. Bogotá D.C.- Colombia
Col. Reg. ICA No. 998-DB
Ven. SASA B.1.5.979

INDICACIONES

Para la inmunización activa de los equinos, asnales y mulares sanos contra la enfermedad de la Encefalomielititis Equina Venezolana (EEV).

- Vacunar a todos los animales jóvenes desde los 3 meses de edad.
- Equinos menores de 2 semanas de edad y hembras preñadas no deben ser vacunados.
- Revacunar cada 2 años o antes si las autoridades sanitarias así lo recomiendan.

GENERALIDADES

La EEV, es una enfermedad infecciosa de naturaleza viral, que se caracteriza por: fiebre, perturbaciones sensoriales, incoordinación de los movimientos, periodos de excitación, depresión, letargo y elevada mortalidad.

Por ser una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a hombres, la vacunación preventiva de los animales es la única arma de defensa contra la enfermedad.

La inmunización con la vacuna Encefalitis Equina de Vecol se evidencia mediante la aparición de anticuerpos al 90. día después de la aplicación.

De 3 a 5 días después de esta puede presentarse ligera reacción febril.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vacuna reconstituida se administra por **vía subcutánea**, en la región retroescapular (atrás de la paleta) o en la tabla del cuello, en dosis de **2 ml** por animal. Reconstituir cada frasco de 5 dosis con 10 ml de diluyente (Agua estéril para inyección).

PRECAUCIONES

- Después de reconstituido el producto úselo inmediatamente, manteniendo en refrigeración 2°C a 8°C y al abrigo de la luz directa del sol.
- Los envases vacíos y los sobrantes deben disponerse de acuerdo a las normas ambientales vigentes del país.
- Utilice una aguja estéril por cada animal a vacunar.
- Evite el uso de desinfectantes en las agujas y en el sitio de aplicación.
- Las personas autorizadas para la aplicación del biológico o colaboradores, deben evitar tener la inoculación accidental con el biológico o el contacto directo de este con membranas mucosas y ojos. En caso de accidente informe a los servicios de salud o consulte al Médico.
- Como sucede en otras vacunaciones, en animales susceptibles pueden presentarse reacciones anafilácticas después de su uso; se recomienda una terapia de soporte apropiada.




Vecol S.A. Bogotá D.C.- Colombia

V00

4 mm

GUÍA DE COLOR
Inserto doble Vacuna Encefalitis Equina Tiro
Impresión Litogr. a 1 tinta: Negro 100%
Tamaño: 22 cm largo x 14 cm alto
Papel bond 16
Versión 00
(2023-04.18)

GRÁFICO 2
Preparación de la Vacuna Encefalitis Equina
25 dosis



1. a) Vacuna Encefalitis Equina por 25 Ds.
b) Por 50 ml para la presentación de 25 Dosis.
2. Con jeringa y aguja estéril extraer 10 ml del Diluyente y adicionarlos al frasco que contiene la vacuna liofilizada retirando la luneta del agrafe de aluminio y perforando el tapón. Agitar hasta que el liofilizado se suspenda homogéneamente.
3. Con la misma jeringa extraer toda la vacuna suspendida y adicinarla al frasco que contiene el resto del Diluyente.
4. Agitar hasta obtener una suspensión homogénea; úselo inmediatamente; durante su uso manténgalo refrigerado entre 2°C y 8°C, al abrigo de la luz directa del sol.

V00

Vacuna ENCEFALITIS EQUINA

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN: Cada dosis reconstituida de 2 ml contiene: Virus vivo atenuado de la Encefalomiélitis Equina Venezolana Cepa TC 83: 10^{5.0} DICT 50%.
DICT= Dosis infectante en cultivo de tejido.

INDICACIONES: Para la inmunización activa de los equinos, asnales y mulares sanos contra la enfermedad de la Encefalomiélitis Equina Venezolana (EEV).

- Vacunar a todos los animales jóvenes desde los 3 meses de edad.
- Equinos menores de 2 semanas de edad y hembras preñadas no deben ser vacunados.
- Revacunar cada 2 años o antes si las autoridades sanitarias así lo recomiendan.



4 mm

4 mm

GENERALIDADES

La EEV, es una enfermedad infecciosa de naturaleza viral, que se caracteriza por: fiebre, perturbaciones sensoriales, incoordinación de los movimientos, periodos de excitación, depresión, letargo y elevada mortalidad. Por ser una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a hombres, la vacunación preventiva de los animales es la única arma de defensa contra la enfermedad.

La inmunización con la vacuna Encefalitis Equina de Vecol se evidencia mediante la aparición de anticuerpos al 9o. día después de la aplicación. De 3 a 5 días después de esta puede presentarse ligera reacción febril.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis es de 2 ml por animal. Se aplica vía subcutánea en la región retroescapular o en la tabla del cuello.

PRECAUCIONES

- Después de resuspender úselo inmediatamente; durante su uso manténgalo refrigerado entre 2°C y 8°C, al abrigo de la luz directa del sol.
- Utilice una aguja estéril por cada animal a vacunar.
- Evite el uso de desinfectantes en las agujas y en el sitio de aplicación.
- Las personas autorizadas para la aplicación del biológico o colaboradores, deben evitar tener la inoculación accidental con el biológico o el contacto directo de este con membranas mucosas y ojos. En caso de accidente informe a los servicios de salud o consulte al Médico.
- En caso de accidente consulte al Médico.
- Como sucede en otras vacunaciones, en animales susceptibles pueden presentarse reacciones anafilácticas después de su uso; se recomienda una terapia de soporte apropiada.
- **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PREPARACIÓN DE LA VACUNA PARA SU USO

Véase al final gráfico 1 y gráfico 2.

Consérvese refrigerado entre 2°C y 8°C

PRESENTACIÓN


5 Dosis, 10 Dosis y 25 Dosis con su respectivo diluyente (Agua estéril para inyección).

Consulte al Médico Veterinario.

Elaborado y Distribuido por VECOL S. A. Bogotá D. C. - Colombia.

Colombia Reg. ICA No. 998-DB **Venezuela** SASA B.I. 5.979

GRÁFICO 1 Preparación de la Vacuna Encefalitis Equina 5 dosis y 10 dosis



1. a) Vacuna Encefalitis Equina por 5 Ds y 10 Ds.
b) Diluyente (Agua estéril para inyección).
2. Separe la parte superior (corte o rasgue) del envase del diluyente.
3. Insertar la aguja en el orificio abierto del envase del diluyente, cuidando de no derramar el contenido, extraer el volumen indicado para cada presentación del producto. **10 ml** del diluyente para **5 dosis**, y **20 ml** para **10 dosis**.
4. Adicionar el volumen indicado del diluyente al frasco que contiene la vacuna liofilizada retirando la luneta del agrafe de aluminio y perforando el tapón.
5. Agitar hasta que el liofilizado se suspenda homogéneamente en el líquido; úselo inmediatamente; durante su uso manténgalo refrigerado entre 2°C y 8°C, al abrigo de la luz directa del sol. v00