



FICHA TECNICA PROPIMORF® VECOL 600 SC



Ingredientes Activos:	Dimethomorph	300 g/L
	Propamocarb	300 g/L

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No- 82-93
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (601) 4254800
Página web: vecol.com.co
Número de registro: PL0002102024

A. USO: FUNGICIDA AGRICOLA

PROPIMORF® VECOL 600 SC: El i.a. Dimethomorph ofrece una protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de re infección, ya que interrumpe la formación de la pared celular del hongo, teniendo así la actividad durante todos los estadios del ciclo biológico del hongo. El Propamocarb H-Cl representa un inhibidor con medidas de protección de multi-sitio que controla específicamente enfermedades de oomicetos.

MODO DE ACCIÓN: Acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar

B. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i> Mont. De Bary)	1,0-1,2 L/Ha,	Una sola aplicación
Rosa	Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1,25 L/Ha	Una sola aplicación
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i> Mont. De Bary)	1,0-1,2 L/Ha	Una sola aplicación



FICHA TECNICA PROPIMORF® VECOL 600 SC



CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Aguacate	Tristeza (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	1.2 L/ha	Una sola aplicación

C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

- **“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”**.
- Para aplicaciones terrestres del producto, se deben **“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”**. Dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.
- **“No contamine fuentes de agua”**.
- No descargue ni vierta en el suelo, en sistema de drenaje o cuerpos de agua.
- Tóxico para abejas expuestas a la aspersion directa (por contacto); no aplicar cuando las abejas se encuentren en actividad en el área a tratar o cuando los cultivos y/o malezas estén en floración.
- **“Existe riesgo para las aves”**
- **“Existe riesgo para los peces”**. Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar la escorrentía.

Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir al teléfono en Bogotá: (601) 4254800

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIMI 018000916012 fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono (601) 2886012

E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Líquido – Suspensión concentrada.
- Color blanco



FICHA TECNICA PROPIMORF® VECOL 600 SC



- Olor inoloro
- Densidad a 20°C: 1.19 +/- 0.05 g/ml
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 5.0 – 9.0