FICHA TÉCNICA

FLEXURY UPI SC
(Fluopyram 125 g/L + Pyrimethanil 375 g/L SC)

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida de uso Agrícola
Formulación:	SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC
Ingrediente Activo:	Fluopyram Pyrimethanil
Concentración:	Fluopyram 125 g/L Pyrimethanil 375 g/L
Categoría Toxicológica:	4 – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Ornamentales
Presentación Disponible:	1 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FLEXURY UPI SC es un fungicida con acción sistémica y translaminar que contiene la mezcla de dos ingredientes activos: Fluopyram perteneciente al grupo químico piridinil etil benzamidas, inhibe la respiración mitocondrial del hongo bloqueando el transporte de electrones en la cadena de la respiración a nivel de la succinato deshidrogenasa (Complejo II - Inhibidor SDH). Presenta actividad en varias fases del ciclo de vida de los hongos: germinación de las esporas, elongación del tubo germinativo y crecimiento de micelio y esporulación. Pyrimethanil perteneciente al grupo químico Anilinopirimidinas es un fungicida que inhibe la biosíntesis de la metionina, afectando la formación de proteínas y posterior división celular.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Fluopyram ..... 125 g/L
N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α-trifluoro-o-toluamide de formulación a 20°C

Pyrimethanil ..... 375 g/L
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Objetivo biológico	Dosis	P.C.	L.M.R.	P.R.
Ornamentales (Rosa, Clavel, Pompón) *	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 L/ha	N.A.	N.A.	12 horas

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.
P.R: Periodo de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y la reentrada de personas al área o cultivo tratado.
L.M.R.: Límite máximo de residuos. No Aplica.
N.A.: No aplica

***** *Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este producto plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.*

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar de manera preventiva cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del patógeno, esto dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades, rotando con otros fungicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Revise y calibre bien los equipos de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y a presión constante. En rosa: Usar un volumen de mezcla de 1000 L/ha.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
UPI CROSCIENCES COLOMBIA S.A.S.