FICHA TÉCNICA

PICAPTAIN UPI SC
(Picoxystrobin 200 g/L + Cyproconazole 80 g/L SC)

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida de uso Agrícola
Formulación:	SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC
Ingrediente Activo:	Picoxystrobin
	Cyproconazole
Concentración:	Picoxystrobin 200 g/L
	Cyproconazole 80 g/L
Categoría Toxicológica:	4 – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Arroz
Presentación Disponible:	1 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PICAPTAIN UPI SC es un fungicida sistémico, con acción protectante y curativa. Contiene dos ingredientes activos: Picoxystrobin y Cyproconazole. Picoxystrobin pertenece al grupo químico metoxiacrilatos. Como los demás fungicidas QoI (inhibidores externos de la quinona), actúa a nivel de las mitocondrias, sobre la cadena de transferencia de electrones entre los citocromos b y c1 bloqueando y frenando la síntesis de ATP, lo que conlleva la muerte del hongo por falta de energía para completar sus procesos vitales. Cyproconazole pertenece al grupo químico triazoles, que son inhibidores de la biosíntesis del esterol, el cual es un componente esencial de la membrana de la pared celular de los hongos.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Picoxystrobin ..... 200 g/L
Methyl(E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl}acrylate de formulación a 20°C

Cyproconazole ..... 80 g/L
(2RS, 3RS;2RS, 3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Objetivo biológico	Dosis	P.C.	L.M.R.	P.R.
Arroz	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.5 L/ha	34 día	0.01* mg/Kg 0.1** mg/Kg	4 horas

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.
P.R: Periodo de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y la reentrada de personas al área o cultivo tratado.
L.M.R.: Límite máximo de residuos. *Picoxystrobin, Fuente: European Commission - **Cyproconazole, Fuente: European Commission.
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o con la aparición de los primeros síntomas, esto dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades, rotando con otros fungicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y a presión constante. En arroz usar un volumen de mezcla de 150 a 200 L/ha según el estado de desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
UPI CROSCIENCES COLOMBIA S.A.S.